

① کمپلیکس نمبر

◆ **کمپلیکس نمبر:** $(x + yi)$ کی شکل میں نمبر کو کمپلیکس نمبر کہتے ہیں۔ یہاں (x) اور (y) حقیقی اعداد ہیں۔ (i) کو ایونٹا کہتے ہیں جو کہ $(\sqrt{-1})$ کے برابر ہے۔ (x) حقیقی حصہ ہے جبکہ (y) خیالی حصہ ہے۔

$$2 + 5i \quad 3 - 6i$$

◆ **کمپلیکس نمبر کی مستطیلی شکل:** اس میں کمپلیکس نمبر کو (z) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حقیقی حصے کو $\text{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\text{Im}(y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$z = x + yi = \text{Re}(x) + \text{Im}(y)i$$

◆ **کمپلیکس نمبروں کی برابری:** دو کمپلیکس نمبر ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوں گے اگر ان کے حقیقی حصے $(x_1 = x_2)$ اور خیالی حصے $(y_1 = y_2)$ بھی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$x_1 + y_1i = x_2 + y_2i$$

• ایونٹا کا مربع (i^2) برابر ہے: (-1)

• کمپلیکس نمبر کا تصور کس ریاضی دان نے دیا تھا: (گیرولامو کارڈانو)

• کمپلیکس نمبر خالص خیالی عدد ہو گا اگر: $(x = 0)$

• کمپلیکس نمبر خالص حقیقی عدد ہو گا اگر: $(y = 0)$

$$\diamond (i^2 + i^4) \text{ برابر ہو گا: } (0)$$

◆ $(x + yi)$ خالص خیالی نمبر ہو گا اگر: $(x = 0)$

⊙ کیا صفر ایک کمپلیکس نمبر ہے: جی ہاں، صفر ایک کمپلیکس نمبر ہے۔ ہر حقیقی عدد ایک کمپلیکس نمبر بھی ہوتا ہے۔ جسے $(x + 0i)$ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں صفر کو کمپلیکس نمبر کے طور پر ایسے $(0 + 0i)$ لکھ سکتے ہیں۔

◆ **کمپلیکس نمبروں کی سکیلر ضرب:** کسی عدد (k) سے کمپلیکس نمبر کو ضرب دیں تو حقیقی اور خیالی حصہ عدد (k) گنا بڑھ جاتا ہے۔

$$kz = (kx) + (ky)i$$

◆ **کمپلیکس نمبروں کی جمع:** دو کمپلیکس نمبروں کو جمع کیا جائے تو حقیقی حصے کو حقیقی حصے کے ساتھ اور خیالی حصے کو خیالی حصے کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے۔

$$z_1 + z_2 = (x_1 + y_1i) + (x_2 + y_2i)$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i$$

◆ **کمپلیکس نمبروں کی نفی:** دو کمپلیکس نمبروں کو نفی کیا جائے تو حقیقی حصے کو حقیقی حصے میں سے اور خیالی حصے کو خیالی حصے میں سے نفی کیا جاتا ہے۔

$$z_1 - z_2 = (x_1 + y_1i) - (x_2 + y_2i)$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)i$$

◆ **کمپلیکس نمبروں کی ضرب:** دو کمپلیکس نمبروں کی ضرب ایسے ہی ہو گی جیسے

الجبر میں دو جملوں کو آپس میں ضرب دی جاتی ہے۔ $(a+b)(c+d)$

$$z_1 \times z_2 = (x_1 + y_1i) \times (x_2 + y_2i)$$

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i$$

◆ **کمپلیکس نمبروں کی تقسیم:** دو کمپلیکس نمبروں کی تقسیم کا نجو گیٹ لے کر حل کی جاتی ہے۔ پھر شمار کنندہ کو شمار کنندہ سے اور مخرج کو مخرج سے ضرب دی جاتی ہے۔

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \times \frac{x_2 - iy_2}{x_2 - iy_2}$$

◆ **خاصیت بندش:** دو کمپلیکس نمبروں کو جمع یا ضرب کرنے پر رزلٹ بھی ایک کمپلیکس نمبر ہوتا ہے۔ یہ کلوزر پروپٹی ہے۔

$$z_1 + z_2 = z \quad z_1 z_2 = z$$

◆ **خاصیت مبادلہ:** دو کمپلیکس نمبروں کی جمع یا ضرب کا ترتیب پر کوئی انحصار نہیں ہے۔ رزلٹ ہر صورت میں ایک جیسا رہتا ہے۔ یہ کمیوٹیٹیو پروپٹی ہے۔

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1 \quad z_1 z_2 = z_2 z_1$$

◆ **خاصیت تلازم:** تین کمپلیکس نمبروں کی جمع یا ضرب کا ترتیب پر کوئی انحصار نہیں ہے۔ رزلٹ ہر صورت میں ایک جیسا رہتا ہے۔ یہ ایسوسی ایٹیو پروپٹی ہے۔

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

$$(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$$

◆ **جمعی ذاتی عنصر:** جمعی ذاتی کمپلیکس نمبر $(0 = 0 + 0i)$ کو کسی بھی کمپلیکس نمبر میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ اس سے کمپلیکس نمبر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

$$z + 0 = 0 + z = z$$

◆ **ضربی ذاتی عنصر:** ضربی ذاتی کمپلیکس نمبر $(1 = 1 + 0i)$ کو کسی بھی کمپلیکس نمبر سے ضرب کیا جاسکتا ہے۔ اس سے کمپلیکس نمبر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

$$z \times 1 = 1 \times z = z$$

◆ **جمعی معکوس:** ہر کمپلیکس نمبر کو اسی کے نفی $(-z)$ کے ساتھ جمع کرنے پر رزلٹ صفر ہوتا ہے۔

$$z + (-z) = (-z) + z = 0$$

◆ **ضربی معکوس:** ہر کمپلیکس نمبر کو اسی کے الٹ (z^{-1}) کے ساتھ ضرب کرنے پر رزلٹ ایک ہوتا ہے۔

$$z(z^{-1}) = (z^{-1})z = 1$$

◆ **تقسیمی خاصیت لمحاظ جمع:** کمپلیکس نمبر بریکٹ کے اندر ضرب ہو سکتا ہے۔

$$z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$$

• کمپلیکس نمبروں کا الجبرا بنایا تھا: (رافیل بومبلی)

$$\diamond (5 - 2i) \text{ کا جمعی معکوس ہے: } (-5 + 2i)$$

$$\diamond (1 + i) \text{ کا ضربی معکوس ہے: } (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i)$$

$$3x + 2$$

$$4y^2 - 2$$

◆ **کثیر رتی:** ایک متغیر میں کثیر رتی ایک ایسی عبارت ہے جو مندرجہ ذیل شکل میں ہو۔ اس میں (a_n) مستقلات جبکہ (x^n) متغیرات ہیں۔ (n) کو کثیر رتی کی ڈگری یاد رکھتے ہیں۔

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 x^0$$

◆ **مساوات:** دو اعداد یا دو رتوں کے درمیان برابری کے تعلق کے ساتھ ظاہر کی گئی عبارت کو مساوات کہتے ہیں۔ اس میں برابری کی علامت (=) استعمال ہوتی ہے

$$5x = 2y$$

$$6 = 6$$

◆ **دو درجی مساوات:** ایک ہی متغیر میں دوسری ڈگری والی کثیر رتی مساوات کو دو درجی مساوات کہتے ہیں۔ اس مساوات میں (a, b, c) حقیقی اعداد ہیں۔ جبکہ (a) اور (b) صفر نہیں ہو سکتے۔ اس کا درجہ (2) ہوتا ہے۔

$$ax^2 + bx + c = 0$$

◆ **خالص دو درجی مساوات:** ایسی دو درجی مساوات جس میں (b) صفر ہو، خالص دو درجی مساوات کہلاتی ہے۔ اس مساوات میں (a, c) حقیقی اعداد ہیں۔ جبکہ (a) صفر نہیں ہو سکتا۔ اس کا درجہ (2) ہوتا ہے۔

$$ax^2 + c = 0$$

◆ **ایک درجی مساوات:** ایک ہی متغیر میں یک ڈگری والی کثیر رتی مساوات کو، یک درجی مساوات کہلاتی ہے۔ اس مساوات میں (b, c) حقیقی اعداد ہیں۔ جبکہ (b) اور (c) صفر نہیں ہو سکتے۔ اس کا درجہ (1) ہوتا ہے۔

$$bx + c = 0$$

◆ **کسری مساوات:** ایسی مساوات جس میں متغیر، مخرج میں بھی ہو، کسری مساوات کہلاتی ہے۔ یہ دو درجی، خالص دو درجی، یا ایک درجی مساوات ہو سکتی ہے۔

$$x^2 + \frac{2}{x} + 3 = 0$$

◆ **روٹس:** دو درجی مساوات کے متغیر کی ایسی قیمتیں جو مساوات کو مکمل طور پر حل کریں، مساوات کے روٹس کہلاتے ہیں۔ روٹس کم از کم دو ہوتے ہیں۔

$$x = l \quad x = m \quad S.S = \{l, m\}$$

◆ **مفر حاصل ضرب خاصیت:** اگر دو روٹس کی حاصل ضرب صفر ہو تو یہ دونوں روٹس صفر کے برابر ہوں گے یا کم از کم ایک روٹ صفر کے برابر ہوگا۔

$$(x + l)(x + m) = 0$$

◆ **دو درجی کلیہ:** دو درجی مساوات کے دونوں روٹس کو ایک فارمولا کے ذریعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس فارمولا کو کیوڈریک فارمولا کہتے ہیں۔

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

◆ **آرگینڈ مستوی:** اگر کسی پلین میں (x) ایکسز پر کمپلیکس نمبر کا حقیقی حصہ اور (y) ایکسز پر خیالی حصہ لیا جائے تو ایسی پلین کو آرگینڈ پلین یا کمپلیکس پلین کہتے ہیں۔ اس پلین میں کمپلیکس نمبروں کے مترتب جوڑے بنتے ہیں۔

$$z = x + yi$$

$$z = (x, y)$$

◆ **کمپلیکس نمبر کا انجوگیٹ:** کسی بھی کمپلیکس نمبر میں ایونٹ کی علامت تبدیل کرنے پر حاصل ہونے والے نئے کمپلیکس نمبر کو پہلے کا انجوگیٹ کہتے ہیں۔ اسے $(\bar{z})$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$z = x + yi$$

$$\bar{z} = x - yi$$

$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$	$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$
$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$	$\bar{\bar{z}} = z$

◆ **کمپلیکس نمبر کا مڈپولس:** آرگینڈ مستوی میں مرکز سے کمپلیکس نمبر کے آرڈر پوائنٹ تک فاصلے کو کمپلیکس نمبر کا مڈپولس کہتے ہیں۔ اسے $(|z|)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$z = x + yi$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|z| = |\bar{z}|$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

$$|z| = |-z| = |\bar{z}| = |-\bar{z}|$$

◆ کمپلیکس نمبر کا حقیقی اور خیالی حصہ معلوم کرنے کا فارمولا:

$$\text{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$\text{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

• آرگینڈ مستوی کس ریاضی دان نے بنائی تھی: (جین آرگینڈ)

• ایونٹ کا مڈپولس $(|i|)$ برابر ہوتا ہے: (1)

◆ اگر $(z = 4 - 3i)$ ہو تو $(z\bar{z})$ ہوگا: (25)

◆ $(9 - 4i)$ کا انجوگیٹ ہے: $(9 + 4i)$

◆ اگر $(z = 4 + 4i)$ ہو تو $(z + \bar{z})$ ہوگا: (8)

◆ اگر $(z = 5 + 4i)$ ہو تو $(|z|)$ ہوگا: $(\sqrt{41})$

◆ $(2 - 3i)(2 + 3i)$ کا حقیقی حصہ ہے: (4)

◆ $(2 - i)(2 + i)$ کا خیالی حصہ ہے: (0)

◎ کمپلیکس نمبر اور انجوگیٹ کی حاصل ضرب کیا ہوگی: جب کمپلیکس نمبر کو اس کے انجوگیٹ سے ضرب دی جاتی ہے تو نتیجہ ہمیشہ ایک غیر منفی حقیقی نمبر ہوتا ہے

$$(x + yi)(x - yi) = (x^2 + y^2)$$

② دو درجی مساواتیں

◆ **الجبری جملہ:** مستقلات اور متغیرات کا ایسا مجموعہ جو حسابی عوامل $(\pm)$ کی علامات کے ذریعے جوڑا ہوا ہو، الجبری جملہ کہلاتا ہے۔

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

♦ دو درجی مساوات کے روٹس کا مجموعہ: (sum)

$$S = \alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

♦ دو درجی مساوات کے روٹس کی حاصل ضرب: (product)

$$P = \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

♦ روٹس (α, β) کی مدد سے دو درجی مساوات بنانے کا فارمولا:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

♦ اگر (x^2) کا عددی سر ایک ہو تو روٹس کا مجموعہ ہوگا: $(S = -b)$

♦ اگر (x^2) کا عددی سر ایک ہو تو روٹس کا حاصل ضرب ہوگا: $(P = c)$

♦ اگر مستقل مقدار (c) صفر ہو تو روٹس کا مجموعہ ہوگا: $(S = -b/a)$

♦ اگر مستقل مقدار (c) صفر ہو تو روٹس کا مجموعہ ہوگا: $(P = 0)$

♦ مساوات $(3x^2 + 5x - 12 = 0)$ کے روٹس کا مجموعہ ہے: $(-\frac{5}{3})$

♦ مساوات $(3x^2 + 5x - 12 = 0)$ کے روٹس کی حاصل ضرب ہے: (-4)

♦ روٹس (3) اور (2) کی مساوات ہے: $(x^2 - 5x + 6 = 0)$

♦ **فرق کنندہ:** دو درجی مساوات کے دو درجی کلیہ میں جذر کی علامت کے نیچے آنے

والی عبارت کو دو درجی مساوات کا فرق کنندہ کہتے ہیں۔ یہ دو درجی مساوات کے ہر روٹس کی نوعیت یا خصوصیت کو بتاتا ہے۔

$$\text{Disc} = b^2 - 4ac$$

* اگر فرق کنندہ کا جواب مکمل مربع ہو اور صفر سے بڑا ہو تو دو درجی مساوات کے دونوں روٹس، حقیقی اعداد (ناطق) اور آپس میں برابر نہیں ہوں گے۔

* اگر فرق کنندہ کا جواب مکمل مربع نہ ہو اور صفر سے بڑا ہو تو دو درجی مساوات کے دونوں روٹس، حقیقی اعداد (غیر ناطق) اور آپس میں برابر نہیں ہوں گے۔

* اگر فرق کنندہ کا جواب صفر کے برابر ہو تو دو درجی مساوات کے دونوں روٹس، حقیقی اعداد اور آپس میں برابر ہوں گے۔

* اگر فرق کنندہ کا جواب صفر سے چھوٹا ہو تو دو درجی مساوات کے دونوں روٹس، خیالاتی یا ایک دوسرے کا کمپلیکس کانجوگیٹ ہوں گے۔

♦ مساوات $(x^2 + 5x - 5 = 0)$ کا فرق کنندہ ہے: (45)

♦ اگر $(b^2 - 4ac > 0)$ مکمل مربع ہو تو روٹس ہوں گے: (غیر مساوی)

♦ اگر $(b^2 - 4ac = 0)$ مکمل مربع ہو تو روٹس ہوں گے: (مساوی)

♦ **غیر مساوات:** دو اعداد یا دو رقموں کے درمیان غیر برابری کے تعلق کو ظاہر

کرنے کے لیے استعمال ہونے والی عبارت کو غیر مساوات کہتے ہیں۔ اس میں غیر برابری کی علامات $(>, <, \geq, \leq)$ استعمال کی جاتی ہیں۔

♦ **ٹرانسپوزیشن:** کسی رقم کو مساوات کی ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر لے جانے

سے اس کی علامت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے ٹرانسپوزیشن کہتے ہیں۔

$$x + 2y = 0$$

$$x = -2y$$

♦ دو درجی مساوات میں (a) صفر ہو تو وہ بن جاتی ہے: (یک درجی مساوات)

♦ دو درجی مساوات میں (b) صفر ہو تو وہ بن جاتی ہے: (خالص دو درجی مساوات)

♦ دو درجی مساوات کا گراف کیسا ہوتا ہے: (پیرابولا)

♦ اگر (x^2) کا عددی سر مثبت ہو تو دو درجی مساوات کا گراف کیسا ہوگا: $(\cup)$

♦ اگر (x^2) کا عددی سر منفی ہو تو دو درجی مساوات کا گراف کیسا ہوگا: $(\cap)$

♦ مساوات $(2x^2 - x + 1 = 0)$ کی قسم ہے: (دو درجی مساوات)

♦ مساوات $(3x^2 - 9 = 0)$ کا حل ہے: $(\pm\sqrt{3})$

♦ مساوات $(x - 3)(x + 3)$ کے روٹس ہیں: $(3, -3)$

⊙ دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقہ لکھیں: بذریعہ تجزی، تکمیل مربع کا

طریقہ، دو درجی کلیہ استعمال کرنے کا طریقہ، گراف کا طریقہ استعمال کرنا۔

⊙ کیا یہ $(\frac{x+y}{2} > \sqrt{xy})$ درست ہے: اگر (x) اور (y) دو حقیقی اعداد ہوں تو

یہ عبارت تب درست ہوگی جب درمیان میں بڑا ہے یا برابر ہے کی علامت ہو۔

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

⊙ دو درجی مساوات گرافیکل طریقہ سے کیسے حل ہوتی ہے: دو درجی مساوات کو

گراف کے طریقہ سے حل کیا جائے تو حل سیٹ میں وہ دو پوائنٹس آئیں گے یہاں

گراف کا پیرابولا (x) ایکسز کو کٹ کرے گا۔ سب سے پہلے دو درجی مساوات کو دو

درجی تفاعل کی شکل میں لکھ کر تفاعل کی راسی شکل بنائی جاتی ہے۔ اس طرح راس

(h, k) حاصل ہوتے ہیں۔

$$y = ax^2 + bx + c$$

دو درجی تفاعل

$$a(x - h)^2 + k$$

راسی شکل

♦ **نقطہ تقاطع:** وہ پوائنٹ یہاں دو خط آپس میں ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں،

نقطہ تقاطع کہلاتا ہے۔ اسے انٹر سیکشن پوائنٹ بھی کہتے ہیں۔

* ایک خط یہاں (x) ایکسز اور (y) ایکسز کو کٹ کرے گا وہ دو نقاط، یک درجی

تفاعل اور ایکسز کے درمیان نقاط تقاطع ہوں گے۔

* دو خط یہاں ایک دوسرے کو آپس میں کٹ کرے گے وہ ایک نقطہ، دو درجی

تفاعل کے درمیان نقطہ تقاطع ہوگا۔

* ایک خط اور دو درجی تفاعل کا پیرابولا یہاں ایک دوسرے کو کٹ کرے گے وہ دو

نقاط، یک درجی تفاعل اور دو درجی تفاعل کے درمیان نقطہ تقاطع ہوگا۔

♦ ایک سیدھی لائن کھینچنے کے لیے کم از کم کتنے پوائنٹس ہونے چاہیے: (2)

♦ دو درجی مساوات کے روٹس الفا (α) اور بیٹا (β) کی شکل میں:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

♦ **کالم:** قالب کے ارکان کو عمودی ترتیب میں پڑھا جائے تو اسے کالم کہتے ہیں۔
جیسے اس قالب کی پہلے کالم میں (1, 2, 3) ارکان ہیں جبکہ دوسرے کالم میں (4, 5, 6) ارکان ہیں۔ کالموں کی تعداد کو (n) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

♦ **قالب کا مرتبہ:** قالب میں قطاروں اور کالموں کی تعداد کو اس قالب کا مرتبہ کہتے ہیں۔ قالب کے مرتبہ کو اس ترتیب (m-by-n) کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad 2\text{-by-}3$$

♦ **مساوی قالب:** اگر دو قالبوں کا مرتبہ ایک جیسا ہو اور ان کے تمام متعلقہ ارکان بھی برابر ہوں۔ تو ایسے قالب ایک دوسرے کے مساوی قالب کہلاتے ہیں۔

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 2 & 3+3 \\ 2+2 & 7 \end{bmatrix}$$

♦ **دو تری ارکان:** قالب کے دو تری موجود ارکان کو دوتری ارکان کہتے ہیں۔ قالب کے دو تری (a₁₁, a₂₂, a₃₃, ...) ارکان آتے ہیں۔ قالب کے دو تری کو پرنسپل، مین یا ایڈنگ ڈایا گوئل کہتے ہیں۔

$$H = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- سب سے پہلے قالب کا لفظ استعمال کیا: (جیمز جوزف سیلوئسٹر)
- قالب سے متعلق مقالہ کس نے شائع کروایا تھا: (ار تھر کیلی)
- سب سے پہلے قالب میں مربعی بریکٹ استعمال کی تھی: (جوزف سیلوئسٹر)
- ♦ اگر $\begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ہو تو (a) کیا ہوگا: (5)

♦ **قطاری قالب:** ایسا قالب جس میں صرف ایک قطار ہو، قطاری قالب کہلاتا ہے

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

♦ **کالمی قالب:** ایسا قالب جس میں صرف ہی ایک کالم ہو، کالمی قالب کہلاتا ہے۔

$$J = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

♦ **مربعی قالب:** ایسا قالب جس میں قطاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہو، مربعی قالب کہلاتا ہے۔ اس کا مرتبہ (2-by-2) ہے۔

$$K = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

♦ **مستطیلی قالب:** ایسا قالب جس میں قطاروں اور کالموں کی تعداد برابر نہ ہو، مستطیلی قالب کہلاتا ہے۔ اس کا مرتبہ (2-by-3) ہے۔

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$5x \geq 2y$$

$$6 > 3$$

♦ **دو درجی غیر مساوات:** ایک ہی متغیر میں دوسری ڈگری والی کثیر رتی غیر مساوات کو دو درجی غیر مساوات کہتے ہیں۔ اس غیر مساوات میں (a, b, c) حقیقی اعداد ہیں۔ جبکہ (a) اور (b) صفر نہیں ہو سکتے۔ اس کا درجہ (2) ہوتا ہے۔ اس میں ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$) جیسی علامات استعمال کی جاتی ہیں۔

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0$$

• ($>$, $<$) والی غیر مساوات کا کھلا وقفہ کیسے لکھا جاتا ہے: (a, b)

• ($\geq$, $\leq$) والی غیر مساوات کا بند وقفہ کیسے لکھا جاتا ہے: [a, b]

♦ **کلیہ:** ایک ایسی مساوات جو کسی مسئلہ سے متعلق تمام قابل پیش مقداروں کو ایک تعلق کی شکل میں ظاہر کرے، فارمولا کہلاتا ہے۔

$$P = 2(L + W)$$

• فارمولا میں مسئلہ کو ظاہر کیا جاتا ہے: (سجیکٹ)

• فارمولا میں مقداروں کو ظاہر کیا جاتا ہے: (رقوم)

• مستطیل کے احاطہ کا فارمولا ہے: (P = 2L + 2W)

• مربع کے احاطہ کا فارمولا ہے: (P = 4L)

• دائرہ کے رقبہ کا فارمولا ہے: (A = πr^2)

• حرکت کی پہلی مساوات کا فارمولا ہے: (V_f = V_i + at)

• حرکت کی دوسری مساوات کا فارمولا ہے: (S = V_it + $\frac{1}{2}at^2$)

• حرکت کی تیسری مساوات کا فارمولا ہے: (2aS = V_f² - V_i²)

♦ مساوات (x - 2c = b) کا سجیکٹ (c) کیا ہے: ($\frac{x-b}{2}$)

3) قالب

♦ **قالب:** قالب اعداد کی ایک ایسی مستطیلی ترتیب ہے جسے قطاروں اور کالموں کی صورت میں مربعی بریکٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ یہ ارکان مخصوص الجبری قوانین کے تابع ہوتے ہیں۔ اسے میٹرک بھی کہتے ہیں۔

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

♦ **قالب کے ارکان:** کسی قالب میں مربعی بریکٹ کے اندر لکھے گئے حروف یا اعداد کو قالب کے ارکان کہتے ہیں۔ جیسے اس قالب میں (1, 2, 3) ارکان ہیں۔

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

♦ **قطار:** قالب کے ارکان کو افقی ترتیب میں پڑھا جائے تو اسے قطار کہتے ہیں۔ جیسے اس قالب کی پہلی قطار میں (1, 2, 3) ارکان ہیں جبکہ دوسری قطار میں (4, 5, 6) ارکان ہیں۔ قطاروں کی تعداد کو (m) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

♦ **وتری قالب:** ایسا قالب جس میں صرف وتری ارکان ہوں، وتری قالب کہلاتا ہے۔ وتر پر کم از کم ایک رکن غیر صفر ہونا چاہیے۔

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

♦ **سکیلر قالب:** ایسا قالب جس کے تمام وتری ارکان ایک جیسے اور غیر صفر ہوں، سکیلر قالب کہلاتا ہے۔ اس میں غیر وتری ارکان صفر ہوتے ہیں۔

$$N = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

♦ **مفری قالب:** ایسا قالب جس کے تمام ارکان صفر ہوں، صفری قالب کہلاتا ہے۔ اسے (O) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسے نل میٹرک بھی کہتے ہیں۔

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

♦ **وحدانی قالب:** ایسا قالب جس میں تمام وتری ارکان (1) ہی ہوں، وحدانی قالب کہلاتا ہے۔ اسے (I) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$I_1 = [1] \quad I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

♦ **قالب کا ٹرانسپوز:** کسی قالب کی قطاروں کو کالموں یا کالموں کو قطاروں میں بدلنے سے حاصل ہونے والے نئے قالب کو قالب کا ٹرانسپوز کہلاتے ہیں۔ اس کو (A^t) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad A^t = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

♦ **سمیٹرک قالب:** اگر ایک قالب اپنے ٹرانسپوز کے برابر ہو تو وہ ایک دوسرے کا سمیٹرک قالب کہلاتے ہیں۔ (A = A^t)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad A^t = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

♦ **اسکیو سمیٹرک قالب:** اگر ایک قالب اپنے ٹرانسپوز کے نفی کے برابر ہو تو وہ ایک دوسرے کا اسکیو سمیٹرک قالب کہلاتے ہیں۔ (A = -A^t)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \quad A^t = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$$

♦ **منفی قالب:** کسی قالب کے تمام ارکان کو (-1) سے ضرب دیں تو نیا حاصل ہونے والا قالب پہلے قالب کا منفی قالب کہلاتا ہے۔

$$A = [3 \quad -4] \quad -A = [-3 \quad 4]$$

• قالب کا ڈبل ٹرانسپوز برابر ہوتا ہے: (اصل قالب)

♦ قالب (0 5 3) کو نفی قسم کا ہے: (قطاری قالب)

♦ قالب (2 3) کو نفی قسم کا ہے: (کالمی قالب)

♦ اگر (A = A^t) ہو تو (A) ہوگا: (سمیٹرک قالب)

♦ قالب (1 0 0 0 1 0) کو نفی قسم کا ہے: (وحدانی قالب)

♦ قالب (3 1 3 2 0 2) کے ٹرانسپوز کا مرتبہ ہے: (2-by-3)

♦ **قالب کی سکیلر ضرب:** قالب کو کسی سکیلر عدد (k) سے ضرب دیں تو قالب کے ہر رکن کو (k) سے ضرب دی جاتی ہے۔

$$A = [3 \quad 4] \quad 5A = [15 \quad 20]$$

♦ **قالبوں کی جمع:** دو قالبوں کی جمع میں متعلقہ ارکان کو جمع کیا جاتا ہے۔ دونوں قالبوں کا مرتبہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ رزلٹ کا مرتبہ بھی سیم ہونا چاہیے۔

$$A = [3 \quad 4] \quad A = [2 \quad 0]$$

$$A + B = [3 + 2 \quad 4 + 0] = [5 \quad 4]$$

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

$$(A - B)^t = A^t - B^t$$

♦ **قالبوں کی نفی:** دو قالبوں کی نفی میں متعلقہ ارکان کو تفریق کیا جاتا ہے۔ دونوں قالبوں کا مرتبہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ رزلٹ کا مرتبہ بھی سیم ہونا چاہیے۔

$$A = [3 \quad 4] \quad A = [2 \quad 0]$$

$$A - B = [3 - 2 \quad 4 - 0] = [1 \quad 4]$$

♦ **قانون مبادلہ بالحاظ جمع:** دو قالبوں کی جمع کا ترتیب پر کوئی انحصار نہیں ہے۔ رزلٹ ہر صورت میں ایک جیسا رہتا ہے۔

$$A + B = B + A$$

♦ **قانون ملازم بالحاظ جمع:** تین قالبوں کی جمع کا ترتیب پر کوئی انحصار نہیں ہے۔ رزلٹ ہر صورت میں ایک جیسا رہتا ہے۔

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

♦ **جمعی ذاتی قالب:** جمعی ذاتی قالب (O) کو کسی بھی قالب میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ اس سے اصل قالب پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

$$A + O = O + A = A$$

♦ **جمعی معکوس:** ہر قالب کو اسی کے منفی قالب (-A) کے ساتھ جمع کرنے پر رزلٹ صفری قالب ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ دونوں قالب ایک دوسرے کے جمعی معکوس کہلاتے ہیں۔

$$A + (-A) = (-A) + A = O$$

• قانون مبادلہ بالحاظ نفی کیا ہے: (A - B ≠ B - A)

♦ اگر (A = [3 4]) اور (B = [7 8]) ہو تو (A+B) ہوگا: ([10 12])

♦ اگر (A = [3 4]) اور (B = [7 8]) ہو تو (B-A) ہوگا:

[4 4]

♦ قالب $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ کا جمعی معکوس ہے: $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$

♦ **قالبوں کی ضرب:** اگر پہلے قالب کے کالموں کی تعداد، دوسرے قالب کی قطاروں کی تعداد کے برابر ہو تو وہ دونوں قالب ضرب ہو سکتے ہیں۔ حاصل ضرب کا مرتبہ اس طرح ہونا چاہیے۔

$$AB = (\text{rows of } A) - \text{by} - (\text{columns of } B)$$

♦ **قانون مبادلہ بالفاظ ضرب:** دو قالبوں کی ضرب کا ترتیب پر انحصار ہوتا ہے۔
زلزل ہر صورت میں مختلف رہتا ہے۔

$$AB \neq BA$$

♦ **قانون ملازم بالفاظ ضرب:** تین قالبوں کی ضرب کا ترتیب پر کوئی انحصار نہیں ہے۔ زلزل ہر صورت میں ایک جیسا رہتا ہے۔

$$(AB)C = A(BC)$$

♦ **قانون تقسیمی بالفاظ ضرب:** یہ جمع اور نفی دونوں کے لیے ہے۔

$$A(B \pm C) = AB \pm AC$$

$$(A \pm B)C = AC \pm BC$$

♦ **ضربی ذاتی قالب:** ضربی ذاتی قالب (I) کو کسی بھی قالب کے ساتھ ضرب کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اصل قالب پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

$$AI = IA = A$$

♦ **ضربی معکوس:** ہر قالب کو اسی کے الٹ قالب (A^{-1}) کے ساتھ ضرب کرنے پر زلزل وحدانی قالب ہوتا ہے۔ دونوں قالب ایک دوسرے کے ضربی معکوس کہلاتے ہیں۔

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj. } A}{|A|}$$

♦ **مقطع:** وتری ارکان کی حاصل ضرب اور غیر وتری ارکان کی حاصل ضرب کے فرق کو مقطع کہتے ہیں۔ اسے $|A|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad |A| = ad - bc$$

♦ **نادر قالب:** ایسا قالب جس کا مقطع صفر ہو، سکولر قالب کہلاتا ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad |A| = 0$$

♦ **غیر نادر قالب:** ایسا قالب جس کا مقطع صفر نہ ہو، نان سکولر قالب کہلاتا ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad |A| \neq 0$$

♦ **قالب کا ایڈجائنٹ:** وتری ارکان کی جگہ تبدیل کرنے اور غیر وتری ارکان کی علامات تبدیل کرنے پر قالب کا ایڈجائنٹ حاصل ہوتا ہے۔ اسے $(\text{Adj. } A)$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$A = \begin{bmatrix} a & +b \\ -c & d \end{bmatrix} \quad \text{Adj. } A = \begin{bmatrix} d & -b \\ +c & a \end{bmatrix}$$

• کس قالب کا معکوس نہیں ہوتا: (نادر قالب)

• قطاروں اور کالموں کو تبدیل کرنے پر قیمت ایک جیسی رہتی ہے: (مقطع)

♦ قالب $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ کا مقطع ہے: (12)

♦ **ایک درجی ہمزاد مساواتیں:** دو یا دو سے زیادہ ایسی الجبری مساواتیں جن میں دو یا دو سے زیادہ متغیرات ہوں اور جنہیں ایک مشترک حل نکالنے کے لیے ایک وقت حل کیا جائے، ایک درجی ہمزاد مساواتیں کہلاتی ہیں۔

$$ax + by = m \quad cx + dy = n$$

• گیریل کرائمر نے اپنا طریقہ کب شائع کیا تھا: (1750)

• گیریل کرائمر نے کب اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کی تھی: (18 سال کی عمر)

⊙ ایک درجی ہمزاد مساواتوں کو حل کرنے کے طریقے لکھیں: ہمزاد مساواتوں کو حل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ قالب کے معکوس کا طریقہ، کرائمر کا طریقہ۔

④ تعمل

♦ **فنکشن:** سیٹ (X) سے سیٹ (Y) تک تفاعل ایک ایسا قاعدہ ہے جو سیٹ

(X) کے ہر رکن کو سیٹ (Y) کے صرف ایک مخصوص رکن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اسے $(X : X \rightarrow Y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

♦ **ڈومین:** فنکشن $(X : X \rightarrow Y)$ میں سیٹ (X) کے ارکان کو ڈومین کہتے ہیں۔ یہ فنکشن کی ان پٹ ہوتی ہے۔

♦ **کوڈومین:** فنکشن $(X : X \rightarrow Y)$ میں سیٹ (Y) کے ارکان کو ڈومین کہتے ہیں۔ یہ فنکشن کی ممکنہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔

♦ **رینج:** فنکشن $(X : X \rightarrow Y)$ کی اصل آؤٹ پٹ کو فنکشن کی رینج کہتے ہیں۔ رینج، کوڈومین کی تحتی سیٹ ہوتی ہے۔

♦ **عکس:** فنکشن $(X : X \rightarrow Y)$ کے آؤٹ پٹ رکن کو اُس کے متعلقہ ان پٹ رکن کا امیج کہتے ہیں۔ جیسے یہاں (y) ایک امیج ہے۔

$$y = f(x)$$

♦ **ماقبل عکس:** فنکشن $(X : X \rightarrow Y)$ کی ان پٹ رکن کو اُس کے متعلقہ

آؤٹ پٹ رکن کا پری امیج کہتے ہیں۔ جیسے یہاں (x) ایک پری امیج ہے۔

$$y = f(x)$$

♦ **فنکشن پر ریاضیاتی عوامل:** جمع، نفی، ضرب، تقسیم۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

♦ ایک تفاعل کی ترکیب (fog)(x) برابر ہوگا: f(g(x))

♦ اگر f(x) = 2x+3 اور g(x) = x+1 ہو تو f(x) + g(x) ہوگا:
(3x + 4)

♦ اگر f(x) = 5x+2 اور h(x) = 2x-2 ہو تو f(x) - h(x) ہوگا:
(3x + 4)

♦ اگر f(x) = 3x+1 اور g(x) = 2x ہو تو g(x) × f(x) ہوگا:
(6x² + 2x)

♦ اگر f(x) = x²-4 اور g(x) = x+2 ہو تو f(x) / g(x) ہوگا:
(x - 2)

♦ **مطلق قدر تفاعل:** ایسا فنکشن جس میں مطلق قدر بار (|x|) کے اندر ایک

الجبری جملہ بند ہوتا ہے، اسے ابلٹیوٹ ویلیو فنکشن کہتے ہیں۔ اس کا گراف (V) شکل کا ہوتا ہے جو (y) ایکسز کے لحاظ سے سمیٹرک رہتا ہے۔ یہ گراف اس (0, 0) پر اپنی سمت تبدیل کرتا ہے۔

$$f(x) = |x|$$

♦ **مطلق قدر:** نمبر لائن پر زیر و پوائنٹ سے فاصلہ کو کسی عدد کی ابلٹیوٹ ویلیو کہتے ہیں۔ یہ فاصلہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ اسے (|x|) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

♦ **مطلق یک درجی مساوات:** ایسی مساوات جس میں مطلق قدر، الجبری جملہ کو دی جاتی ہے۔

$$|ax + b| = 0$$

♦ **مطلق یک درجی غیر مساوات:** ایسی غیر مساوات جس میں مطلق قدر، الجبری جملہ کو دی جاتی ہے۔

$$|ax + b| > 0 \quad |ax + b| \leq 0$$

♦ مطلق قدر تفاعل کے گراف کی شکل ہوتی ہے: (V شکل)

♦ فنکشن والے گراف کو عمودی لائن کٹ کرتی ہے: (1 نقطہ)

⊙ مطلق قدر تفاعل کی راسی شکل لکھیں: اس میں (h, k) ایک راس ہے۔ (a) صفر نہیں ہو سکتا۔ یہ گراف لائن (x = h) کے گرد سمیٹرک ہوتا ہے۔

$$g(x) = a|x - h| + k$$

5 الجبری کسر

♦ **الجبری کسر:** ایسی کسر ہے جس کے شمار کنندہ اور مخارج یا دونوں میں الجبری جملے شامل ہوں، الجبری کسر کہلاتی ہے۔

$$\frac{2x+9}{10x}$$

$$\frac{2x+y}{3xy}$$

♦ **ناطق جملہ:** شکل میں الجبری کسر کو ناطق جملہ کہتے ہیں۔ یہاں P(x) کی

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

♦ **تفاعل کی ترکیب:** دو یا دو سے زیادہ فنکشنز کے ملنے سے بننے والے نئے فنکشن کے عمل کو کمپوزیشن آف فنکشن کہتے ہیں۔ اسے ترکیب کا عمل کنندہ (o) کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسے کمپوزیشن آپریٹر بھی کہتے ہیں۔

$$f : X \rightarrow Y$$

$$g : Y \rightarrow Z$$

$$g \circ f : X \rightarrow Z$$

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

$$f \circ g(x) \neq g \circ f(x)$$

♦ **این جیکٹیو فنکشن:** ایسا فنکشن جس میں ہر این پٹ کوئی نہ کوئی منفرد آؤٹ پٹ بنائے، ون ٹو ون فنکشن کہلاتا ہے۔ اس میں کسی بھی دو این پٹس کی آؤٹ پٹ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوڈومین کے ہر رکن کو صرف ایک بار مپ کیا جاسکتا ہے۔

$$f(x) = 2x$$

♦ **سریجیکٹیو فنکشن:** ایسا فنکشن جس میں کوڈومین کا ہر رکن، ڈومین کے کسی نہ کسی رکن کے ساتھ مپ ہوتا ہے، آن ٹو فنکشن کہلاتا ہے۔ کوڈومین کے ارکان کو ایک سے زیادہ بار مپ کیا جاسکتا ہے۔

$$f(x) = x^2$$

♦ **ہائی جیکٹیو فنکشن:** ایسا فنکشن جس میں این جیکٹیو اور سریجیکٹیو فنکشن دونوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، ہائی جیکٹیو فنکشن کہلاتا ہے۔

$$f(x) = x + 1$$

♦ **مکوس تفاعل:** ایسا فنکشن جو اصل فنکشن کے اثر کو الٹ کر دے، پہلے کا انورس فنکشن کہلاتا ہے۔ اس میں ڈومین، رینج اور رینج، ڈومین بن جاتی ہیں۔

$$f : X \rightarrow Y$$

$$f(x) = y$$

$$f^{-1} : Y \rightarrow X$$

$$f^{-1}(y) = x$$

♦ **عمودی خط کا ٹیسٹ:** اگر ہر عمودی خط کسی دیئے گئے گراف کو صرف اور صرف ایک ہی پوائنٹ پر کٹ کرے تو وہ گراف فنکشن کا گراف ہوگا۔

♦ **افقی خط کا ٹیسٹ:** اگر ہر افقی خط کسی دیئے گئے گراف کو صرف اور صرف ایک ہی پوائنٹ پر کٹ کرے تو وہ گراف فنکشن کا گراف ہوگا۔

• گالفرائیڈ ولیم بسز نے کب فنکشن کا لفظ استعمال کیا تھا: (1673)

• مکوس فنکشن ہمیشہ ہوگا: (ہائی جیکٹیو فنکشن)

• افقی خط کا ٹیسٹ پاس کرنے والا فنکشن ہوتا ہے: (ون ٹو ون فنکشن)

♦ اگر $f(x) = \frac{5x-6}{3}$ ہو تو $f(3)$ کی قیمت ہوگی: (3)

♦ اگر $f(x) = x^3$ ہو تو $f(-2)$ کی قیمت ہوگی: (-8)

♦ ایک فنکشن (X) سے (Y) کی طرف ہو تو لکھا جائے گا: (f : X → Y)

اور $Q(x)$ دونوں کثیر ر قتی ہیں۔ جبکہ $Q(x)$ صفر نہیں ہونی چاہیے۔

$$\frac{x+1}{x+2} - \frac{5}{x-2}$$

♦ **ناطق جملہ کی آسان شکل:** ناطق جملہ کے شمار کنندہ اور مخرج میں موجود کا من فیٹر کو ختم کر کے اسے سادہ شکل میں تبدیل کرنے کو سمپلی فکیشن کہتے ہیں۔

♦ **ناطق جملہ کی مہارت:** ناطق جملہ کی ویلیو کو ختم کیے بغیر اس پر مختلف ریاضیاتی عوامل استعمال کرنے کو ناطق جملوں کی مہارت کہتے ہیں۔

♦ **دوررجی شکل میں قابل تبدیل مساوات:** ایسی مساوات جس میں کچھ مناسب ٹرم کی تبدیلی کرنے پر وہ دوررجی مساوات کی شکل میں تبدیل ہو جائے، دوررجی شکل میں قابل تبدیل مساوات کہلاتی ہے۔

$$ax^{2n} + bx^n + c = 0$$

♦ **قوت نمائی مساوات:** ایسی مساوات جن میں متغیر قوت نمائی جگہ پر آئے، قوت نمائی مساوات کہلاتی ہیں۔

$$a^{2x} + b^x + c = 0$$

♦ **معکوس مساوات:** ایسی مساوات جس میں متغیر کو اس کے معکوس سے بدلنے سے مساوات میں کوئی تبدیلی نہ آئے، معکوس مساوات کہلاتی ہے۔

$$x + \frac{1}{x} = 5$$

♦ عبارت $\left(\frac{2x-1}{x^2+4}\right)$ ہے: (الجبری جملہ)

♦ اس $\left(\frac{18a^2bc^2}{12ac}\right)$ کی سادہ شکل ہے: $\left(\frac{3abc}{2}\right)$

♦ اس $\left(\frac{15xyz}{10}\right)$ کی سادہ شکل ہے: $\left(\frac{3xyz}{2}\right)$

♦ اس $\left(\frac{3x+1}{5} + \frac{2x+3}{5}\right)$ کی سادہ ترین شکل ہے: $\left(\frac{5x+4}{5}\right)$

♦ اس $(x-y)$ کی سادہ ترین شکل ہے: (x^2-y^2)

♦ اس $(x-y)$ کی سادہ ترین شکل ہے: (x^3-y^3)

♦ مساوات $\left(\frac{5}{x} + \frac{1-x}{3} = \frac{1}{6x}\right)$ کو کسی قسم کی ہے: (کسری مساوات)

♦ مساوات $(5^x + 64^{-x} - 20 = 0)$ کو کسی قسم کی ہے: (قوت نمائی مساوات)

♦ مساوات $(y^2 - 24y + 128 = 0)$ کے روٹس ہیں: $(-8, 16)$

♦ $(3x^2 + 10x + 3 = 0)$ کے اجزائے ضربی ہیں: $(x+3)(3x-1)$

⑥ ویکٹر

♦ **مستطیلی محدوداتی مستوی:** ایسی پلین جس میں دو نمبر لائنز ایک دوسرے کو عموداً

کٹ کرتی ہیں۔ (x) ایکسز پر افقی نمبر لائن ہوتی ہے جبکہ (y) ایکسز پر عمودی نمبر لائن ہوتی ہے۔ اس میں چار ربع بنتی ہیں۔ اسے ریگٹنگولر کورڈینیٹ پلین کہتے ہیں۔

♦ **محدود (x):** مستطیلی محدوداتی مستوی میں افقی نمبر لائن کو (x) ایکسز کہتے ہیں۔

اس کی داہیں طرف مثبت نمبر جبکہ بائیں طرف منفی نمبر لکھے جاتے ہیں۔

♦ **محدود (y):** مستطیلی محدوداتی مستوی میں عمودی نمبر لائن کو (y) ایکسز کہتے

ہیں۔ اس کی اوپر کی طرف مثبت نمبر جبکہ نیچے کی طرف منفی نمبر لکھے جاتے ہیں۔

♦ **مرکز:** مستطیلی محدوداتی مستوی میں یہاں (x) ایکسز اور (y) ایکسز ملتے ہیں،

اس پوائنٹ کو مرکز (O) کہتے ہیں۔ اس کے مترتب جوڑے $(0, 0)$ ہیں۔

♦ **مترتب جوڑا:** مستطیلی محدوداتی مستوی میں کسی بھی پوائنٹ (P) کو دو نمبرز سے

ظاہر کیا جاتا ہے۔ دو نمبروں کے اس جوڑے کو آرڈر پیئر (x, y) کہتے ہیں۔ اس

میں پہلا نمبر (x) ابسیسا کہلاتا ہے جبکہ دوسرا نمبر (y) آرڈینیٹ کہلاتا ہے۔

♦ **سکیلر:** ایسی مقدار جس کی صرف عددی قیمت ہو لیکن سمت نہ ہو، سکیلر کہلاتی

ہے۔ ٹائم، ماس، والیوم، سپیڈ۔

♦ **ویکٹر:** ایسی مقدار جس کی عددی قیمت اور سمت دونوں ہوں، ویکٹر کہلاتی ہے۔

ولاسٹی، ایکسلریشن، موینیمٹ۔

♦ **منفی ویکٹر:** ایسا ویکٹر جس کی مقدار دیئے گئے ویکٹر کے برابر ہو لیکن سمت

مخالف ہو، منفی ویکٹر کہلاتا ہے۔ $(-a, -a)$

♦ **مساوی ویکٹر:** ایسے دو ویکٹر جن کی مقدار اور سمت ایک جیسی ہو، مساوی

ویکٹر کہلاتے ہیں۔ $(a = b)$

♦ **منفی ویکٹر:** ایسا ویکٹر جس کا ابتدائی اور آخری نقطہ ایک ہی ہو، صفری ویکٹر

کہلاتا ہے۔ اس کی مقدار صفر ہوتی ہے اور یہ ہر ویکٹر کے متوازی ہوتا ہے۔

♦ **پوزیشن ویکٹر:** ایسا ویکٹر جو مستطیلی محدوداتی مستوی میں کسی پوائنٹ (x, y)

کی پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

$$\vec{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

♦ **یونٹ ویکٹر:** کسی کورڈینیٹ ایکسز کے ساتھ ویکٹر کی سمت کو ظاہر کرنے والا

ویکٹر، یونٹ ویکٹر کہلاتا ہے۔ اس کی مقدار ایک یونٹ ہوتی ہے۔ (x) ایکسز کی

ساتھ (i) اور (y) ایکسز کے ساتھ (j) بطور یونٹ ویکٹر استعمال ہوتا ہے۔

$$\hat{a} = \frac{a}{|a|}$$

♦ **ویکٹر کی مقدار:** ویکٹر کی ٹیل سے ہیڈ تک لمبائی کو ویکٹر کی نورم یا ویکٹر کی لمبائی

کہتے ہیں۔ اگر کسی ویکٹر کا ٹیل پوائنٹ $P(x_1, y_1)$ پر ہو اور اس کا ہیڈ پوائنٹ

$Q(x_2, y_2)$ پر ہو تو اس کی لمبائی $(|PQ|)$ ایسے معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$|PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$|OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

مرکز سے لمبائی

♦ **ویکٹر کی سکیلر ضرب:** ویکٹر کو کسی عدد (λ) سے ضرب دیں تو ویکٹر کی لمبائی عدد

(λ) گنا بڑھ جاتی ہے۔

$$\lambda \times \vec{a} = \lambda \vec{a} \quad -\lambda \times \vec{a} = -\lambda \vec{a}$$

* اگر عدد $(\lambda > 0)$ صفر سے بڑا ہو تو اصل ویکٹر $(\vec{a})$ اور حاصل ضرب والا ویکٹر

$(\lambda \vec{a})$ ایک ہی سمت میں ہوں گے۔

- ♦ دو ویکٹروں کی جمع ہمیشہ ہوتی ہے: (ویکٹر)
- ♦ ٹرانس لیشن ویکٹر کیا ظاہر کرتا ہے: (حرکت)

7) ٹکونیٹ

- ♦ ٹکونیٹ: ریاضی کی وہ شاخ جس میں مثلث کے اضلاع اور زاویوں کے درمیان تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹرگنومیٹری کہلاتی ہے۔
- ♦ مثلث: تین کونوں والی بند شکل کو مثلث کہتے ہیں۔
- ♦ وتر: مثلث میں (90°) کے زاویے کے سامنے والے ضلع کو وتر کہتے ہیں۔
- ♦ عمود: مثلث میں زیر بحث زاویے کے بالکل سامنے والے ضلع کو عمود کہتے ہیں۔
- ♦ قاعدہ: زیر بحث زاویے اور (90°) کے زاویے کے درمیان والے ضلع کو قاعدہ کہتے ہیں۔
- ♦ ٹکونیٹاتی تقابل: وہ نسبتیں جو مثلث کے زاویوں اور اضلاع کے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ سائن، کاز، ٹین، کو سینڈ، سینڈ، کاٹ۔

$\sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$	$\operatorname{cosec} \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$
$\cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$	$\sec \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$
$\tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$	$\cot \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$
$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$

♦ ٹکونیٹاتی تقابل یا نسبتوں کی قیمتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0

♦ ٹکونیٹاتی تقابل یا نسبتوں کی ہر رابع میں علامات مختلف ہوتی ہے۔

ربع (2) only $\sin \theta$ and $\operatorname{cosec} \theta$ are positive	ربع (1) all are positive
ربع (3) only $\tan \theta$ and $\cot \theta$ are positive	ربع (4) only $\cos \theta$ and $\sec \theta$ are positive

♦ (90° + θ) کے لیے ٹکونیٹاتی تقابل یا نسبتوں کی قیمتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

$\sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta$	$\csc(90^\circ + \theta) = \sec \theta$
$\cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta$	$\sec(90^\circ + \theta) = -\csc \theta$

- * اگر عدد (λ < 0) صفر سے چھوٹا ہو تو اصل ویکٹر (a) اور حاصل ضرب والا ویکٹر (λa) ایک دوسرے کی الٹ سمت میں ہوں گے۔
- ♦ دو ویکٹرز کی حاصل ضرب والے ویکٹرز آپس میں ہوتے ہیں: (متوازی)
- ♦ دو ویکٹرز کی مقدار (|a| = |b|) برابر ہو تو: (a = b)
- ♦ (x) ایکسز اور (y) ایکسز کتنے حصوں میں پلین کو تقسیم کرتے ہیں: (چار)
- ♦ پوائنٹ (4, -4) کس ربع میں آئے گا: (چوتھا)
- ♦ ویکٹر جس کی مقدار (1) ہوتی ہے: (یونٹ ویکٹر)
- ♦ ویکٹر (3i + 4j) کے نورم کی قیمت ہے: (5)
- ♦ اگر (a = λb) ہو تو پھر (a) اور (b) ہوں گے: (متوازی)
- ♦ مرکز سے اس پوائنٹ (3, -2) کا پوزیشن ویکٹر ہوگا: (3i, -2j)
- ♦ اس پوائنٹ (3, 4) سے مرکز کی طرف ویکٹر ہوگا: (-3i, -4j)
- ⊙ ویکٹر کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے: گراف میں ویکٹر کو ایک خط (AB) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس خط کی ٹیل کو ویکٹر کا ابتدائی نقطہ (A) کہتے ہیں جبکہ ہیڈ کو اختتامی نقطہ (B) کہتے ہیں۔ ویکٹر کی علامت کو ایسے (a, a, a) کیا جاتا ہے۔
- ⊙ کیا صفری ویکٹر، یونٹ ویکٹر ہو سکتا ہے: نہیں، کیونکہ صفری ویکٹر کی مقدار (0) ہوتی ہے جبکہ یونٹ ویکٹر کے لیے مقدار (1) ہونی چاہیے۔
- ⊙ یونٹ ویکٹر کا (|a|) کتنا ہوگا: اگر (a) ایک یونٹ ویکٹر ہے تو اس کی مقدار (|a|) بھی (1) ہوگی۔

♦ ویکٹرز کی جمع: ایک ویکٹر کو دوسرے ویکٹر میں جمع کرنا۔

$$\underline{a} + \underline{b} = (x_1 + x_2)\underline{i} + (y_1 + y_2)\underline{j}$$

- ♦ مثلثی قانون: اگر دو ویکٹرز کو ایک مثلث کے دو مسلسل اضلاع سے ظاہر کیا جائے، تو اس مثلث کا تیسرا ضلع ان دونوں ویکٹرز کے مجموعہ کو ظاہر کرتا ہے۔

♦ متوازی الاضلاع کا قانون: اگر دو ویکٹرز کو ایک متوازی الاضلاع کے دو ملحقہ اضلاع سے ظاہر کیا جائے، تو اس کا دوازاں دونوں ویکٹرز کے مجموعہ کو ظاہر کرتا ہے۔

♦ ویکٹرز کی تفریق: ایک ویکٹر سے دوسرے ویکٹر کو نفی کرنا۔

$$\underline{a} - \underline{b} = (x_1 - x_2)\underline{i} + (y_1 - y_2)\underline{j}$$

♦ ہم مستوی ویکٹرز: دو یا دو سے زیادہ ایسے ویکٹرز جو ایک ہی پلین پر واقع ہوں یا متوازی سطحوں پر ہوں، کو پلینر ویکٹرز کہلاتے ہیں۔


♦ ٹرانس لیشن: کسی بھی شکل، نقطے یا جسم کو اس کی شکل، سائز اور رخ تبدیل کیے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو ٹرانس لیشن کہتے ہیں۔

♦ ٹرانس لیشن ویکٹر: ایسا ویکٹر جو کسی شکل، نقطے یا جسم کو تبدیل کیے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو ظاہر کرتا ہے۔ نئی نقطے یا جسم کو اصل کا امیج کہتے ہیں۔

♦ اگر (OA = a) اور (OB = b) ہو تو پھر (AB) ہوگا: (b - a)


- ♦ **تین ہندسے پر رنگ:** یہ سمت بتانے کا ایک طریقہ ہے جس میں شمال سے کلاک وار رخ میں زاویے کو تین ہندسوں میں مپا جاتا ہے۔
- ♦ **بنیادی سمتیں:** یہ کمپاس پر چار اہم سمتیں ہیں۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔
- ♦ **ہائی سمتیں:** یہ کمپاس پر بنیادی سمتوں کے درمیان کی سمتیں ہیں۔ جیسے شمال مشرق، شمال مغرب، جنوب مشرق، جنوب مغرب۔
- ♦ بیرنگ زاویہ کس سکیل میں مپا جاتا ہے: (ڈگری)
- ♦ بیرنگ زاویہ کی پیمائش کس طرف سے کی جاتی ہے: (شمال)
- ♦ بیرنگ زاویہ کتنے ہندسوں میں لکھا جاتا ہے: (3 ہندسے)

⑧ دائرہ کا وتر




- ♦ **دائرہ:** تمام ایسے نقاط کا مجموعہ جو ایک مرکزی نقطہ سے یکساں فاصلے پر ہوں۔
- ♦ **محیط:** دائرے کی کل بیرونی لمبائی یا اس کا گھیراؤ، دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔

$$C = 2\pi r$$



- ♦ **وتر:** دائرے کے اندر ایسی سیدھی لائن جو دائرے کے کنارے پر موجود دو نقاط کو آپس میں ملائے، وتر کہلاتی ہے۔



- ♦ **قطر:** وہ وتر جو دائرے کے مرکز سے گزرے اور اسے دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے، قطر کہلاتا ہے۔
- ♦ **نصف دائرہ:** دائرے کا آدھا حصہ جو قطر اور آدھے محیط کے درمیان بنتا ہے۔



- ♦ **قطعہ:** دائرے کے وتر اور قوس کے درمیان گھرا ہوا رقبہ، قطعہ کہلاتا ہے۔




- ♦ **قوس:** دائرے کے محیط کا کوئی بھی حصہ یا ٹکڑا، دائرے کی قوس کہلاتی ہے۔



- ♦ **مغیرہ قوس:** نصف دائرے سے چھوٹی قوس کو مغیرہ قوس کہتے ہیں۔



- ♦ **کبیرہ قوس:** نصف دائرے سے بڑی قوس کو کبیرہ قوس کہتے ہیں۔



- ♦ **رداسی قطعہ:** دائرے کے مرکز سے محیط تک کے فاصلہ، رداسی قطعہ کہلاتا ہے۔
- ♦ **رداس:** رداسی قطعہ کی پیمائش کو رداس کہتے ہیں۔ یہ مرکز سے محیط تک ہوتا ہے

$\tan(90^\circ + \theta) = -\cot\theta$	$\cot(90^\circ + \theta) = -\tan\theta$
♦ $(180^\circ - \theta)$ کی تکنیکیاتی تفاعل یا نسبتوں کی قیمتیں مندرجہ ذیل ہیں۔	
$\sin(180^\circ - \theta) = \sin\theta$	$\csc(180^\circ - \theta) = \csc\theta$
$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos\theta$	$\sec(180^\circ - \theta) = -\sec\theta$
$\tan(180^\circ - \theta) = -\tan\theta$	$\cot(180^\circ - \theta) = -\cot\theta$
♦ منفی زاویے کا مثلثیاتی تفاعل یا نسبتوں پر کیا اثر ہے۔	
$\sin(-\theta) = -\sin\theta$	$\cos(-\theta) = \cos\theta$
$\tan(-\theta) = -\tan\theta$	

- ♦ نسبت $(\cot 60^\circ)$ کی قیمت ہے: $(\frac{1}{\sqrt{3}})$
- ♦ تمام تکنیکیاتی نسبتیں کس ربع میں مثبت ہیں: (پہلا ربع)
- ♦ نسبت $(\operatorname{cosec} \theta)$ کس ربع میں مثبت ہے: (پہلا اور دوسرا)
- ♦ $(\sin 90^\circ + \theta)$ برابر ہے: $(\cos \theta)$
- ♦ $(\tan 180^\circ - \theta)$ برابر ہے: $(-\tan \theta)$

- ♦ **قائمہ الزاویہ مثلث:** ایسی مثلث جس کا ایک زاویہ (90°) ڈگری کا ہو۔
- ♦ **مساوی الساقین مثلث:** ایسی مثلث جس میں دو سائیڈز کی لمبائی برابر ہو۔
- ♦ **غیر قائمہ الزاویہ مثلث:** ایسی مثلث جس میں کوئی بھی زاویہ (90°) کا نہ ہو۔
- ♦ **ایکویسٹ مثلث:** ایسی مثلث جس میں تمام زاویے (90°) ڈگری سے کم ہوں۔
- ♦ **ایٹھوڈ مثلث:** ایسی مثلث جس میں ایک زاویہ (90°) ڈگری سے بڑا ہو۔
- ♦ **سائن کا قانون:** یہ قانون مثلث کے اضلاع اور ان کے مقابل زاویوں کے سائن کے درمیان تناسب کی برابری کو ظاہر کرتا ہے۔

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

- ♦ **کوسائن کا قانون:** یہ قانون مثلث کے تینوں اضلاع اور ایک زاویہ کے درمیان تعلق بیان کرتا ہے۔ یہ قانون عموماً غیر قائمہ مثلث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma$$

- ♦ **مثلث کا رقبہ:** مثلث کی سطح کے پھیلاؤ کی پیمائش کو مثلث کا رقبہ کہتے ہیں۔

$$\Delta ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} bc \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} ac \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} ab \cdot \sin \gamma$$

$$\Delta ABC = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha} = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$


$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

- ♦ **سائن کا قانون:** $(\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma})$

- ♦ **کوسائن کا قانون:** $(\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab})$


- ♦ **مثلث کا ایریا:** $(\frac{1}{2} ac \sin \beta)$

۱۔ اگر دو دائروں کے تین پوائنٹس مشترک ہوں تو وہ ایک ہی دائرہ ہوتا ہے۔
 ۲۔ دو دائرے ایک دوسرے کو صرف دو پوائنٹس پر قطع کر سکتے ہیں۔
 ۳۔ دائرے کے مرکز سے وتر کی تنصیف کرنے والا خط اس وتر پر عمود ہوتا ہے۔
 ۴۔ دائرے کے مرکز سے وتر پر گرایا گیا عمود اس کی تنصیف کرتا ہے۔
 ۵۔ اگر دائرے کے دو وتر برابر ہوں تو وہ مرکز سے برابر فاصلے پر ہوں گے۔
 ۶۔ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے برابر فاصلے پر ہوں، آپس میں برابر ہوتے ہیں۔
 ۷۔ اگر دائرے کی دو قوسیں برابر ہوں تو ان کے متعلقہ وتر بھی برابر ہوں گے۔
 ۸۔ اگر دائرے کے دو وتر برابر ہوں تو ان کی متعلقہ قوسیں بھی برابر ہوں گی۔
 ۹۔ دائرے کے برابر وتر مرکز پر برابر زاویے بناتے ہیں۔
 ۱۰۔ اگر دو تروں کے ذریعے دائرے کے مرکز پر بننے والے زاویے برابر ہوں تو وہ وتر بھی لمبائی میں برابر ہوں گے۔



◆ **سیکٹر:** دائرے کے دو، رداسوں اور قوس کے درمیان گھرا ہوا رقبہ، سیکٹر کہلاتا ہے۔
 ◆ **محیطی زاویہ:** وہ زاویہ جو دائرے کے کسی قطعہ کے اندر محیط پر بنے، قطعہ میں زاویہ کہلاتا ہے۔
 ◆ **قوس پر زاویہ:** وہ زاویہ جو کسی قوس کے سروں سے محیط کے کسی نقطہ پر بنے، قوسی زاویہ کہلاتا ہے۔
 ◆ **مرکزی زاویہ:** وہ زاویہ جو دائرے کے مرکز پر دو، رداسوں کے ملنے سے بنے، مرکزی زاویہ کہلاتا ہے۔
 ◆ **قاطع خط:** وہ سیدھی لائن جو دائرے کے محیط کو دو مختلف نقاط پر قطع کرتی ہوئی گزر جائے، قاطع خط (AB) کہلاتی ہے۔
 ◆ **ہم مرکز دائرے:** ایسے دائرے جن کا مرکز ایک نقطہ ہی ہو، ہم مرکز دائرے کہلاتے ہیں۔
 ◆ **نقطہ:** ایسا دائرہ جس کا رداس صفر ہو، نقطہ کہلاتا ہے۔
 ◆ **وتر کی تنصیف:** کسی وتر کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔
 ◆ **متماثل:** ایسی اشکال جو سائز اور بناوٹ میں بالکل ایک جیسی ہوں۔
 ◆ **غیر ہم قاطع:** ایسے نقاط جو ایک سیدھی لائن پر موجود نہ ہوں۔
 ◆ **مساوی الفاصلہ:** ایک دوسرے سے برابر فاصلے پر واقع ہونا۔
 • صغیرہ قوس میں مرکزی زاویہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے: (180°)
 • کبیرہ قوس میں مرکزی زاویہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے: (180°)
 • نصف دائرہ میں مرکزی زاویہ کتنا ہوتا ہے: (180°)
 • دائرے کے محیط سے مرکز تک فاصلہ کہلاتا ہے: (رداس)
 • ایک ہی دائرے کے تمام رداس ہوتے ہیں: (سب برابر)
 • دائرے کی بیرونی حد کو کہتے ہیں: (محیط)
 • محیط کے کسی بھی حصے کو کہتے ہیں: (قوس)
 • مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے: (قطر)
 • دی گئی شکل میں (AB) کیا ہے: (وتر)
 • دی گئی شکل میں بڑی قوس کوئی ہے: (mBDC)
 • تین غیر ہم خط نقاط سے کتنے دائرے گزر سکتے ہیں: (ایک)
 • وتر کا عمودی ناصف ہمیشہ کہاں سے گزرتا ہے: (مرکز سے)
 • دائرے کے اندر تمام مرکزی زاویوں کا مجموعہ کتنا ہے: (360°)
 • تین غیر ہم خط نقاط میں سے صرف اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔
 • سیدھی لکیر پر موجود تین یا اس سے زیادہ پوائنٹس سے کوئی دائرہ نہیں گزر سکتا۔

⑨ دائرہ کا مماس



◆ **مماس:** وہ خط جو دائرے کو صرف ایک نقطہ پر چھو کر گزرتا ہے، ٹینجنٹ کہلاتا ہے۔

◆ **نقطہ مماس:** دائرے کا وہ نقطہ یہاں پر مماس اسے چھوتا ہے۔

◆ **قوس کی لمبائی:** رداس اور مرکزی زاویہ کی بنا پر قوس کی لمبائی کا فارمولا ہے۔

$$l = r\theta$$

◆ **سیکٹر کا ایریا:** یہ قوس اور 2 رداس کی درمیانی جگہ معلوم کرنے کا فارمولا ہے۔

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} rl$$

◆ مماس دائرہ کے محیط کو کتنے نقاط پر چھوتا ہے: (ایک نقطہ)

◆ دائرہ کے باہر کسی نقطہ سے کتنے مماس کھینچے جاسکتے ہیں: (دو)

◆ دائرہ کے مرکز سے کتنے مماس کھینچے جاسکتے ہیں: (صفر)

◆ دائرہ کا رداس اور مماس ایک دوسرے کے ہوتے ہیں: (عمودی)

◆ نصف دائرہ سے بڑے قطعہ میں بننے والا زاویہ ہوتا ہے: (حادہ)

◆ دائرہ کی قوس سے مرکز پر بننے والے زاویہ کو کیا کہتے ہیں: (مرکزی زاویہ)

◆ نصف دائرہ میں بننے والے زاویہ کی مقدار کیا ہوتی ہے: (90°)

◆ ایک ہی قطعہ دائرہ میں بننے والے کوئی سے دو زاویے ہوتے ہیں: (مساوی)

◆ دائرہ کے سیکٹر کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا ہے: ($\frac{1}{2} r^2 \theta$)

◆ اگر (r=6cm) اور ($\theta=2\text{rad}$) ہو تو قوس کی لمبائی ہوگی: (12cm)

۱۔ اگر ایک لائن دائرے کے رداس کے سرے پر عمود ہو تو وہ مماس ہوتی ہے۔

۲۔ مماس اور رداس، ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔

۳۔ بیرونی نقطے سے ایک ہی دائرے پر کھینچے گئے دو مماسوں کی لمبائی برابر ہوتی ہے۔

۴۔ اگر دو دائرے باہر سے ایک دوسرے کو چھوئیں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ

ان کے رداسوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔

لہ اگر دو دائرے اندرونی طور پر ایک دوسرے کو چھوئیں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔

لہ دائرے کی چھوٹی قوس سے بننے والا مرکزی زاویہ، اسی قوس کے مقابل بڑی قوس پر بننے والے زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

لہ دائرے کے قطعہ میں بننے والے کوئی سے دو زاویے ہمیشہ برابر ہوتے ہیں۔

لہ نیم دائرے میں بننے والا زاویہ ہمیشہ قائمہ (90°) ہوتا ہے۔

لہ نیم دائرے سے بڑے قطعہ میں بننے والا زاویہ (90°) سے کم ہوتا ہے۔

لہ نیم دائرے سے چھوٹے قطعہ میں بننے والا زاویہ (90°) سے زیادہ ہوتا ہے۔

لہ دائرے کے اندر بننے والے چوکور کے مخالف زاویوں کا مجموعہ (180°) ہوتا ہے۔

⑩ دائرہ کی حیثیت سے

♦ ہم خطی نقطہ: ایک ہی لائن پر موجود پوائنٹس کو ہم خطی نقطہ کہتے ہیں۔

♦ شکل میں ($\overline{ABC}$) کیا ہے: (ایک مماس)

♦ قوس کتنی اقسام کی ہوتی ہیں: (2)

♦ دائرے کے وتر کا عمودی ناصف ہمیشہ کہاں سے گزرتا ہے: (مرکز)

♦ ایک دائرے میں صرف ایک کیا ہوتا ہے: (مرکز)

♦ دائرے کے باہر وہ نقطہ جہاں دو مماس ملتے ہیں: (ایک زاویہ)

♦ دائرے پر ایک نقطہ سے دو برابر مماس کھینچے جاسکتے ہیں جب وہ نقطہ دائرے سے واقع ہو نا چاہیے: (دائرہ کے باہر)

♦ ایک بیرونی نقطہ سے دائرے پر کھینچے گئے مماس ہوتے ہیں: (لمبائی میں مساوی)

♦ دائرے کا مرکز معلوم کرنے کے لیے کتنے وتروں کی ضرورت ہوتی ہے: (2)

♦ قوس کے وسطی نقطہ پر مماس کیسے کھینچا جاتا ہے: (قوس کے اختتامی نقاط کو ملانا)

♦ نقطہ مماس پر رداس اور مماس کے درمیان زاویہ ہوتا ہے: (90°)

⑪ معلومات داری

♦ **تعدد:** کوئی مقدار ڈیٹا میں کتنی بار آئی ہے، فریکوینسی کہلاتی ہے۔

♦ **مجموعی تعدد:** یہ پچھلے تمام تعدد کو جمع کر کے حاصل ہونے والی رقم ہوتی ہے۔

♦ **مجموعی تعدد کا ٹیبل:** یہ مجموعی تعدد کو ٹیبل میں ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔

♦ **مجموعی تعدد کی کثیر الاخراج:** یہ مجموعی تعدد کو گراف میں ظاہر کرنے کا طریقہ

ہے۔ اس میں ڈیٹا کو گراف پر نکات لگا کر اور انہیں سیدھی لائنوں سے جوڑ کر دکھایا

جاتا ہے۔ اسے ترسیم بھی کہا جاتا ہے۔ اسے (کمی کا طریقہ) اور (زیادہ کا طریقہ) کی

شکل میں بنا سکتے ہیں۔

♦ **وسطی:** ترتیب شدہ ڈیٹا کی بالکل درمیانی قیمت کو وسطیہ کہتے ہیں۔

♦ **چھادی حصہ:** ڈیٹا کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرنے والی قیمتیں کو چھادی حصہ

کہتے ہیں۔ ہر چھادی حصہ میں (25%) ڈیٹا آتا ہے۔ (Q_1) سے (Q_3) تک کل تین عدد، چھادی حصے ہیں۔

♦ **پہلا چھادی حصہ:** سب سے نیچے والا چھادی حصہ جس میں پہلا (25%) ڈیٹا آتا ہے۔ اسے (Q_1) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

♦ **دوسرا چھادی حصہ:** اس میں پہلا (50%) ڈیٹا آتا ہے۔ اسے وسطیہ بھی کہتے ہیں۔ اسے (Q_2) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

♦ **تیسرا چھادی حصہ:** اوپر والا چھادی حصہ جس میں (75%) تک ڈیٹا آتا ہے۔ اسے (Q_3) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

♦ **دسواں حصہ:** ڈیٹا کو دس برابر حصوں میں تقسیم کرنے والی قیمتیں کو دسواں حصہ کہتے ہیں۔ ہر دسویں حصہ میں (10%) ڈیٹا آتا ہے۔ (D_1) سے (D_9) تک کل نو عدد، دسواں حصے ہیں۔

♦ **سوداں حصہ:** ڈیٹا کو سو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والی قیمتیں کو سوداں حصہ کہتے ہیں۔ ہر سوویں حصہ میں (1%) ڈیٹا آتا ہے۔ (P_1) سے (P_{99}) تک کل ننانوے عدد، سوویں حصے ہیں۔

♦ **اندرونی چھادی حصہ کی سخت:** تیسرے چھادی حصے اور پہلے چھادی حصے کے فرق کو اندرونی چھادی حصہ کی سخت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چھادی حصوں کے درمیان پھیلاؤ کی پیمائش ہے۔

$$Q = Q_3 - Q_1$$

♦ **بکس اور وسکر پلاٹ:** یہ ڈیٹا کے پھیلاؤ، وسطیہ اور چھادی حصوں کو ایک ڈبے اور لکیروں کے ذریعے تصویری شکل میں دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں بکس درمیان کے (50%) ڈیٹا کو ظاہر کرتا ہے۔ بکس کے اندر میڈین لائن (Q_2) ڈیٹا کے بالکل وسط کو ظاہر کرتی ہے۔ بکس سے باہر نکلنے والی وسکر لکیریں جو کم ترین اور زیادہ سے زیادہ قیمتوں تک جاتی ہیں، یہ پورے ڈیٹا کے پھیلاؤ کو دکھاتی ہیں۔ یہ پلاٹ ڈیٹا کے پانچ اہم اعداد پر مشتمل ہوتا ہے۔

$$\text{mini} \leftarrow \boxed{Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3} \rightarrow \text{max}$$

♦ **انتشاری خاکہ:** دو متغیرات کے درمیان تعلق کو نکات کے ذریعے دکھانے والا گراف کو انتشاری خاکہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک متغیر (x) ایکسز پر اور دوسرا متغیر (y) ایکسز پر پلاٹ کیا جاتا ہے۔ گراف پر ہر نقطہ آرڈر پیئر کو ظاہر کرتا ہے۔

♦ **موزوں ترین لائن:** انتشاری خاکے کے درمیان سے گزرنے والی لائن جو ڈیٹا کے جنرل رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔

♦ **ارتباط:** انتشاری خاکے میں دو متغیرات کے درمیان باہمی تعلق کو ارتباط کہتے ہیں۔ ایک متغیر میں تبدیلی سے دوسرا متغیر بھی تبدیل ہوتا ہے۔

♦ **مثبت ارتباط:** دو متغیرات کے درمیان اس طرح کا تعلق کہ جب ایک متغیر

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad \text{غیر گروپ ڈیٹا}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n f_i}} \quad \text{گروپ ڈیٹا}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n f_i} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i}\right)^2}$$

- پہلے بیس مفرد اعداد کی سعت ہے: (69)
- سب سے پہلے معیاری انحراف استعمال کی تھی: (کرل پیئر سن)
- کیا تغیر منفی ہو سکتی ہے: (نہیں)
- کیا معیاری انحراف، تغیر سے زیادہ ہو سکتی ہے: (ہاں)
- اوسط کار گردگی کا کس سے پتہ چلتا ہے: (مین)
- استحکام کا پتہ کس سے چلتا ہے: (معیاری انحراف)
- انتشار کا پیمانہ ہے: (تغیرات)
- تغیرات کا مثبت جذر المربع کہلاتا ہے: (معیاری انحراف)
- انتشار کا پیمانہ نہیں ہے: (حسابی اوسط)
- ڈیٹا (8, 8, 8, 8, 8, 8, 8) کا تغیرات ہے: (0)
- پہلے بیس قدرتی اعداد کی سعت ہے: (19)

12 احتمال

- **احتمال**: کسی واقعے کے ہونے کے چانسز کی عددی پیمائش کو احتمال کہتے ہیں۔
- **بلا ترتیب تجربہ**: ایسا عمل جس کے ممکنہ نتائج پہلے سے معلوم ہوں۔ لیکن واقع ہونے والے نتیجے کا پتہ نہ ہو، بلا ترتیب تجربہ کہلاتا ہے۔ جیسے سکہ اچھالنا۔
- **شماراتی تجربہ**: ایسا بلا ترتیب تجربہ جس کے نتائج کو نمبروں میں لیا جائے۔
- **آزمائش**: بلا ترتیب تجربے کو ایک باری کرنا، آزمائش کہلاتا ہے۔
- **نتائج**: بلا ترتیب تجربے سے حاصل ہونے والا کوئی بھی ایک نتیجہ۔
- **سیمپل سپیس**: تمام ممکنہ نتائج کے سیٹ کو سیمپل سپیس کہتے ہیں۔

$$S = \{\text{head, tail}\}$$

- **سیمپل پوائنٹ**: سیمپل سپیس کا ہر رکن ایک سیمپل پوائنٹ کہلاتا ہے۔
- **واقعہ**: سیمپل سپیس کا کوئی بھی چھوٹا حصہ، واقعہ کہلاتا ہے۔
- **مساوی امکانی واقعات**: وہ واقعات جن کے ہونے کے چانسز برابر ہوں۔ جیسے ایک سکہ اچھالنے پر ہیڈ یا ٹیل آئے گا۔
- **مبینی واقعات**: وہ واقعہ جو لازمی پیش آئے۔ سکہ اچھالنے پر ہیڈ یا ٹیل آئے گا۔
- **ناممکن واقعات**: وہ واقعہ جو کبھی پیش نہ آ سکے۔ سکہ کا کھڑا ہو جانا۔

- بڑھے تو دوسرا متغیر بھی بڑھ جائے، مثبت ارتباط کہلاتا ہے۔ انتشاری خاکے میں اس ارتباط کی موزوں ترین لائن کا گراف اوپر جاتا ہے۔ بلندی اور وزن۔
- **منفی ارتباط**: دو متغیرات کے درمیان اس طرح کا تعلق کہ جب ایک متغیر بڑھے تو دوسرا متغیر کم ہو جائے، منفی ارتباط کہلاتا ہے۔ انتشاری خاکے میں اس ارتباط کی موزوں ترین لائن کا گراف نیچے آتا ہے۔ رفتار اور سفر کا ٹائم۔
- **مفرات تعلق**: اگر دو متغیرات کے درمیان کوئی مستقل تعلق نہ پایا جائے تو اسے صفر تلازم کہتے ہیں۔ جوتے کا سائز اور چمکنگ۔
- (D₃) تک کتنا ڈیٹا پایا جاتا ہے: (30%)
- (P₉₀) تک کتنا ڈیٹا پایا جاتا ہے: (90%)
- (P₂₅) کس سے ملتا جلتا ہے: (Q₁)
- (P₅₀) کس سے ملتا جلتا ہے: (Q₂)
- (P₇₅) کس سے ملتا جلتا ہے: (Q₃)
- مجموعی تعداد حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے: (جمع)
- دوسرا چارہ حصہ کس کو ظاہر کرتی ہے: (وسطانیہ)
- پہلا چارہ حصہ ڈیٹا کو کتنے برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے: (چار)
- سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی قیمت کے فرق کو کہتے ہیں: (سعت)
- انتشاری خاکے کتنے متغیرات کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے: (دو)

♦ **انتشار**: یہ پیمائش کہ ڈیٹا اپنی اوسط قیمت سے کتنا دور پھیلا ہوا ہے۔

♦ **انتشار کے پیمانے**: یہ وہ شماراتی طریقے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیٹا میں موجود قیمتیں اپنی مرکزی قیمت سے کتنی پھیلی ہوئی یا بکھری ہوئی ہیں۔

♦ **سعت**: ڈیٹا کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی قیمت کے فرق کو سعت کہتے ہیں۔ اسے رینج بھی کہتے ہیں۔

$$R = H - L$$

♦ **تغیریت**: تغیریت معلوم کرنے کے لیے ڈیٹا کی اوسط لی جاتی ہے۔ پھر اوسط سے ڈیٹا کی ہر رقم کو نفی کر کے انحراف نکالا جاتا ہے۔ تمام انحراف کی رقوم کی اوسط کو تغیریت کہتے ہیں۔

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

غیر گروپ ڈیٹا

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

گروپ ڈیٹا

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n f_i} - \left(\frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i}\right)^2$$

♦ **معیاری انحراف**: تغیریت کا جذر المربع، جو پھیلاؤ کی سب سے عام پیمائش ہے۔

♦ **باہمی متنافی واقعات:** وہ واقعات جو ایک ہی وقت میں اکٹھے پیش نہ آسکیں۔

صرف ہیڈ آنا، صرف ٹیل آنا۔ ان کا تقاطع خالی سیٹ ہوتا ہے۔

$$H \cap T = \phi$$

♦ **جامع واقعات:** وہ واقعات جو ایک ہی وقت میں اکٹھے پیش آسکتے ہوں۔ ہیڈ اور

ٹیل کا آنا۔ ان کا یونین پوری سیمپل سپیس ہوتی ہے۔

$$H \cup T = S$$

♦ **مکملی واقعات:** اگر ایک واقعہ (A) ہو تو اس کے نہ ہونے کا واقعہ (A-not)

کہلاتا ہے۔ یہ دونوں (A) اور (A-not) ایک دوسرے کے مکملیمینٹ ہیں۔

اسے ایسے (A', A^c, $\bar{A}$) ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہیڈ اور ٹیل مکملیمینٹ ہیں۔

♦ **ابتدائی واقعہ:** ایسا واقعہ جس کا صرف ایک نتیجہ ہو۔ بال کا اچھالنا۔

♦ **واحد واقعہ:** ایسا واقعہ جس کا صرف ایک سیمپل پوائنٹ ہو۔ سکہ کا ہیڈ آنا۔

♦ **مرکب واقعات:** ایک ایسا واقعہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ سادہ واحد واقعات کے

ایک ساتھ ہونے پر مشتمل ہو۔

♦ **آزاد واقعات:** دو یا دو سے زیادہ واقعات اس وقت آزاد واقعات کہلاتے ہیں

جب ایک واقعے کا نتیجہ دوسرے کے نتیجے پر کوئی اثر نہ ڈالے۔

♦ **منحصر واقعات:** دو یا دو سے زیادہ واقعات کو منحصر واقعات کہا جاتا ہے اگر ایک

واقعے کا نتیجہ دوسرے واقعے کے نتیجے پر اثر انداز ہوتا ہو۔

♦ **باہمی متنافی واقعات:** دو یا دو سے زیادہ واقعات باہمی متنافی واقعات کہلاتے ہیں

اگر وہ ایک ہی وقت میں وقوع پذیر نہ ہو سکیں۔

♦ **غیر باہمی متنافی واقعات:** دو یا دو سے زیادہ واقعات غیر باہمی متنافی واقعات

کہلاتے ہیں اگر وہ ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہو سکیں۔

♦ **شجری خاکہ:** شجری خاکہ احتمال میں استعمال ہونے والی ایک بصری پیشکش ہے جو

ایک یا ایک سے زیادہ واقعات کے تمام ممکنہ نتائج کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ شاخوں کی

صورت میں تمام ممکنہ نتائج اور ان کے امکانات کو ظاہر کرنے والا ایک نقشہ ہے۔

♦ **سیمپل سپیس خاکہ:** کسی تجربے کے تمام ممکنہ جوڑوں یا نتائج کو لسٹ کی صورت

میں دکھانے کے طریقے کو سیمپل سپیس خاکہ کہتے ہیں۔

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}$$

♦ **امکانی خاکہ:** کسی تجربے کے تمام ممکنہ جوڑوں یا نتائج کو ٹیبل کی صورت میں

دکھانے کے طریقے کو امکانی خاکہ کہتے ہیں۔

coin (1)

	H	T
H	HH	HT
T	TH	TT

coin (2)

♦ **واقعہ کا احتمال:** کسی بے ترتیب تجربے میں واقع ہونے والے واقعات کی تعداد اور

سیمپل سپیس میں تمام ممکنہ نتائج کی نسبت کو واقعہ کا احتمال کہتے ہیں۔

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$$

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1 \quad 0 \leq P(E) \leq 1$$

• شروع میں احتمال پر کام کیا تھا: (گیر ولاموکار ڈانوں)

• احتمال کی قیمت ہمیشہ صفر سے کہاں تک ہوتی ہے: (1)

• واقعہ (E) کا مکملیمینٹ ہے: ($\bar{E}$)

• ناممکن واقعہ ($\bar{E}$) کا مکملیمینٹ واقعہ کیا ہوگا: (E)

♦ ناممکن واقعے (جو پیش نہ آئے) کا احتمال کتنا ہوتا ہے: (0)

♦ یقینی واقعے (جو پیش آئے) کا احتمال کتنا ہوتا ہے: (1)

♦ ایک غیر جانبدار سکے کو ایک بار اچھالنے پر ہیڈ آنے کا احتمال کیا ہے: (0.5)

♦ اگر $P(A)=0.6$ ہو تو پھر (A-not) کا احتمال کیا ہوگی: (0.4)

♦ دو واقعات باہمی متنافی ہوتے ہیں اگر: (وہ ایک ساتھ وقوع پذیر نہ ہو سکیں)

♦ ایک سکہ اور ڈانس پھیچ کا جائے تو سیمپل پوائنٹس کی تعداد ہوگی: (12)

♦ لڈو کے دانے پر (6) سے بڑا نمبر آنے کا احتمال ہے: (0)

♦ تاش کی گڈی سے پتہ نکالنے کا ممکنہ نتیجہ ہو سکتا ہے: (52)

♦ **احتمال کی جمع:** اگر (A) اور (B) دو غیر باہمی متنافی واقعات ہوں۔

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

اگر (A) اور (B) دو غیر باہمی متصادم واقعات ہوں۔

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

♦ **وین خاکہ:** حلقوں کی مدد سے واقعات اور ان کے تعلقات کو ظاہر کرنے والی

تصویری اظہار کو وین خاکہ کہتے ہیں۔

* اگر (A) اور (B) دونوں واقعات ہوں تو تب ($A \cap B$) واقعہ ہوگا۔

* اگر (A) اور (B) میں سے کوئی ایک واقعہ ہو تو تب ($A \cup B$) واقعہ ہوگا۔

* ($\bar{A}$) ایسا واقعہ ہے جو اسی وقت ہو گا جب (A) واقعہ نہ ہو۔

♦ **امکان کی ضرب:** اگر (A) اور (B) دو آزاد واقعات ہوں۔

$$P(A \text{ and } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

اگر (A) اور (B) دو منحصر واقعات ہوں۔

$$P(A \text{ and } B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B | A)$$

• واقعہ (A) ہونے کے بعد واقعہ (B) پیش آئے تو لکھا جاتا ہے: ($B | A$)

• ($P(A \cup B)$ اور ($P(A \cap B)$) کی جمع کیا ہے: ($P(A) + P(B)$)

♦ کسی تجربے کے تمام ممکنہ نتائج کے احتمالات کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے: (1)

♦ اگر $P(E)=0.07$ ہو تو (E -not) کا احتمال کیا ہوگا: (0.93)